

Calendario de inyecciones

Monitoree fácilmente sus inyecciones de Cortrophin Gel

Antes de inyectarse o de inyectar a otra persona, es importante que reciba capacitación de su proveedor de atención médica. Esta conversación incluirá decidir qué áreas de inyección pueden ser mejores para usted o para la persona a la que inyecte. Utilice este calendario para llevar un registro de su cronograma de tratamiento siguiendo los pasos que se indican a continuación.

1. Elija el mes en el calendario y el tipo de inyección.
2. Complete los números de los días (las fechas).
3. Marque con un círculo la zona de inyección (A a F) para cada día.
4. Para las zonas A y E, indique qué área (1 a 4) se utilizó.
5. Agregue recordatorios o notas, como la hora de la inyección.


Abr
✓ Debajo de la piel (subcutáneo)

	Lun	Mar	Mié
4	5	6	
DEF	A B C D E F	A B C D E F	A B C D E F
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4


(ejemplo)

Áreas apropiadas para la inyección subcutánea (debajo de la piel)


A Parte superior del muslo




B Abdomen



C Lateral de la parte superior del brazo




D Parte posterior de la parte superior del brazo




Áreas apropiadas para la inyección intramuscular (en el músculo)

E Músculo de la parte superior externa del muslo



F Músculo de la parte superior del brazo



Puede inyectarse en la misma área varias veces por semana, pero asegúrese de rotar el lugar de la inyección en esa área cada vez y mantenga al menos 1 pulgada entre los lugares.

Para más información sobre cómo inyectar el Cortrophin Gel, visite Cortrophin.com/using-cortrophin-gel para recursos de utilidad.

También deberá asegurarse de haber extraído la cantidad correcta de medicamento en la jeringa. Esta tabla puede ayudarlo a recordar cuánto medicamento necesitará según lo que le recete su médico.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de Cortrophin Gel. Si necesita calcular dosis adicionales, cada incremento de 20 unidades da como resultado un aumento o una disminución de la cantidad de inyección de 0.25 mL. Por ejemplo, 100 unidades = 1.25 mL.

Cuadro de conversión de dosis de Cortrophin Gel

Unidades	Cantidad de inyección (mL)
120 unidades	1.5 mL
80 unidades	1 mL
40 unidades	0.5 mL
25 unidades	0.3125 mL

Si tiene alguna pregunta acerca de su dosis de Cortrophin Gel, consulte a su proveedor de atención médica para obtener asesoramiento.

Consulte las indicaciones y la información importante de seguridad en la página 2, así como la **información de prescripción** completa.

¿Qué es Purified Cortrophin Gel?

Purified Cortrophin Gel es un medicamento de venta con receta que se inyecta debajo de la piel o en un músculo. Se utiliza con los siguientes fines:

- Tratamiento complementario a corto plazo para ayudar a controlar episodios agudos o ataques de artritis reumatoide, incluida la artritis reumatoide juvenil; artritis psoriásica; espondilitis anquilosante y artritis gotosa aguda.
- Tratamiento de exacerbaciones o tratamiento de mantenimiento en determinados casos de lupus eritematoso sistémico y dermatomiositis sistémica (polimiositis).
- Tratamiento de reacciones cutáneas graves (síndrome de Stevens-Johnson) y psoriasis grave.
- Tratamiento de la dermatitis atópica (eccema) y la enfermedad del suero.
- Tratamiento de afecciones alérgicas e inflamatorias crónicas y agudas graves en diferentes partes del ojo. Esto puede incluir la parte frontal del ojo, como la córnea y el iris, o la parte posterior del ojo, como el nervio óptico y la retina.
- Tratamiento para personas con síntomas de sarcoidosis.
- Reducción de proteínas en la orina de personas con síndrome nefrótico del tipo idiopático (de origen desconocido) sin uremia (acumulación de urea en la sangre debida a disfunción renal) o debido a lupus.
- Ataques agudos o exacerbaciones de la esclerosis múltiple.

Información de seguridad importante

NO use Cortrophin Gel si tiene alguna de las siguientes afecciones:

- Una afección de la piel llamada esclerodermia
- Pérdida de densidad ósea u osteoporosis
- Infecciones micóticas
- Herpes simple ocular (infección ocular)
- Una cirugía reciente
- Úlceras estomacales o antecedentes de úlceras estomacales
- Insuficiencia cardíaca
- Presión arterial alta
- Alergias a proteínas derivadas del cerdo
- Glándulas suprarrenales que no producen suficiente cantidad de la hormona cortisol (insuficiencia corticosuprarrenal primaria) o
- Corteza suprarrenal que produce demasiada cantidad de las hormonas cortisol y aldosterona (hiperfunción corticosuprarrenal)

Informe a su médico si:

- Tiene o ha tenido algún otro problema de salud.
- Está tomando medicamentos recetados o de venta libre, como aspirina, vitaminas y suplementos alimenticios o a base de hierbas.
- Tiene alergias.
- Está por recibir alguna vacuna.

- Está embarazada o planea quedar embarazada. Cortrophin Gel puede dañar al bebé en gestación.
- Está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si Cortrophin Gel pasa a la leche materna y si puede dañar al bebé.

¿Qué información importante debo saber sobre Cortrophin Gel?

Asegúrese de inyectarse Cortrophin Gel exactamente como se lo haya indicado su médico. Siempre inyecte Cortrophin Gel debajo de la piel o en un músculo.

No inyecte Cortrophin Gel directamente en una vena.

- Es posible que tenga más probabilidades de contraer infecciones. Comuníquese con su médico ante el primer signo de infección o fiebre.
- Es posible que su cuerpo no produzca suficiente cortisol natural después de dejar de inyectarse Cortrophin Gel a largo plazo. Esto se llama insuficiencia suprarrenal. Es posible que su médico intente reducir su dosis gradualmente o que le recete un medicamento esteroide para protegerlo hasta que la glándula suprarrenal se recupere.
- Es posible que tenga presión arterial alta, que retenga demasiada sal y agua, o que tenga niveles bajos de potasio en la sangre. Como resultado, su médico puede recomendarle algunos cambios en su dieta, como consumir menos sal o tomar ciertos suplementos.
- El tratamiento con corticotropina puede ocultar síntomas de otras enfermedades. Si está ocurriendo algo más, puede ser más difícil para su médico hacer un diagnóstico.
- El tratamiento con Cortrophin Gel puede hacer que se sienta irritable o deprimido. También puede producirle cambios anímicos o problemas para dormir.
- Es posible que desarrolle ciertas afecciones oculares, como cataratas, glaucoma o daño en el nervio óptico.
- Es posible que desarrolle alergias a Cortrophin Gel. Estas alergias pueden ser graves. Los signos de una reacción alérgica incluyen mareos, náuseas y vómitos, reacciones en la piel (erupción o picazón), hinchazón del rostro, la lengua, los labios o la garganta y dificultad para respirar.
- Los efectos de Cortrophin Gel pueden intensificarse si tiene tiroides hipoactiva o cirrosis hepática.

Los efectos secundarios de Cortrophin Gel incluyen retención de líquido o sal; aumento de peso; debilidad muscular; osteoporosis, úlceras estomacales con posible sangrado; reacciones en el lugar de la inyección; deficiencia de la cicatrización de heridas; presión arterial alta; convulsiones; dolor de cabeza; presentación de un estado cushingoide (una afección hormonal a menudo caracterizada por hinchazón facial y aumento de peso); supresión del crecimiento en niños; y reacciones alérgicas que pueden ser graves.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de Cortrophin Gel. Llame a su médico o farmacéutico para pedirle asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088 o www.fda.gov/medwatch.

Consulte la [Información de prescripción](#) completa.

Mes:

(marque una opción
con un círculo)

Ene Feb Mar Abr Mayo Junio Julio Ago Sep Oct Nov Dic

Tipo de inyección:

(según las instrucciones de su
proveedor de atención médica)

☐ Debajo de la piel (subcutáneo)

☐ En el músculo (intramuscular)

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 
A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 
A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 
A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 
A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 	A B C D E F 1 2 3 4 

Use este espacio para registrar cualquier nota o recordatorio adicional que tenga para usted o su médico.

Consulte las indicaciones y la información importante de seguridad en la página 2, así como la **información de prescripción** completa.

 **Purified Cortrophin® Gel**
repository corticotropin injection USP 80 U/mL

 Cortrophin
In Your Corner