Purified Cortrophin® Gel
repository corticotropin injection USP 80 U/mL

Cortrophin In Your Corner™

Guía para la inyección de Cortrophin Gel

Instrucciones paso a paso para inyectar Cortrophin Gel, tanto debajo de la piel (inyección subcutánea) como en un músculo (inyección intramuscular)

Consulte la información de seguridad importante a lo largo de este folleto y la información de prescripción completa y las instrucciones de uso.

Índice

Asegúrese de leer esta guía completa y las instrucciones de uso antes de comenzar a aplicar la primera inyección y, según sea necesario, antes de las inyecciones siguientes.

Esta guía se creó con fines instructivos. No debe usarse como sustituto de los consejos o las instrucciones específicos de su proveedor de atención médica.

Acerca de Cortrophin Gel 3

¿Qué es Cortrophin Gel? 3

Para comenzar 4

Cómo se aplica la inyección. 4

Áreas que deben evitarse al inyectar. 4

Qué suministros necesita reunir 5

Preparación para la inyección 6

Cómo prepararse para la inyección 6

Carga de la jeringa. 8

Inyección debajo de la piel (subcutánea) 9

Ubicación del lugar para la inyección 9

Aplicación de la inyección 10

Inyección en un músculo (intramuscular) 11

Ubicación del lugar para la inyección 11

Aplicación de la inyección 12

Cómo desechar los suministros usados después de la inyección 13

Programa de apoyo *Cortrophin In Your Corner* 14

Uso e información de seguridad 15

Acerca de Purified Cortrophin® Gel

(repository corticotropin injection USP) 80 U/mL

Una vez que le hayan recetado Cortrophin Gel, posiblemente desee obtener más información sobre su medicamento antes de comenzar el tratamiento.

5 mL
El tamaño del vial no está a escala.

1 mL
El tamaño del vial no está a escala.

¿Qué es Cortrophin Gel?

Cortrophin Gel es un medicamento de venta con receta que se inyecta debajo de la piel o en un músculo. Se utiliza con los siguientes fines:

- Ataques agudos o exacerbaciones de la esclerosis múltiple.
- Tratamiento complementario a corto plazo para ayudar a controlar episodios agudos o ataques de artritis reumatoide, incluida la artritis reumatoide juvenil; artritis psoriásica; espondilitis anquilosante y artritis gotosa aguda.
- Tratamiento de exacerbaciones o tratamiento de mantenimiento en determinados casos de lupus eritematoso sistémico y dermatomiositis sistémica (polimiositis).
- Reducción de proteínas en la orina de personas con síndrome nefrótico del tipo idiopático (de origen desconocido) sin uremia (acumulación de urea en la sangre debida a disfunción renal) o debido a lupus.
- Tratamiento para personas con síntomas de sarcoidosis.
- Tratamiento de afecciones alérgicas e inflamatorias crónicas y agudas graves en diferentes partes del ojo. Esto puede incluir la parte frontal del ojo, como la córnea y el iris, o la parte posterior del ojo, como el nervio óptico y la retina.

Cortrophin Gel es una hormona purificada de origen natural llamada hormona adrenocorticotrópica, o ACTH. La ACTH normalmente se produce en la hipófisis. Se cree que la ACTH en Cortrophin Gel ayuda a reducir la inflamación produciendo cortisol en el cuerpo y aumentando otros factores antinflamatorios.

Información de seguridad importante

NO use Cortrophin Gel si tiene alguna de las siguientes afecciones:

- Una afección de la piel llamada esclerodermia
- Pérdida de densidad ósea u osteoporosis
- Infecciones micóticas
- Herpes simple ocular (infección ocular)
- Una cirugía reciente
- Úlceras estomacales o antecedentes de úlceras estomacales
- Insuficiencia cardíaca
- Presión arterial alta
- Alergias a proteínas derivadas del cerdo
- Glándulas suprarrenales que no producen suficiente cantidad de la hormona cortisol (insuficiencia corticosuprarrenal primaria) o
- Corteza suprarrenal que produce demasiada cantidad de las hormonas cortisol y aldosterona (hiperfunción corticosuprarrenal)

Consulte la información de seguridad importante a lo largo de este folleto y la información de prescripción completa y las instrucciones de uso.

Para comenzar

La función de esta guía paso a paso para la administración es complementar la explicación y la capacitación detalladas que le brindó su proveedor de atención médica. **No** aplicarse la inyección hasta que le hayan enseñado a hacerlo.

Cómo se aplica la inyección

Después de recetarle Cortrophin Gel, su proveedor de atención médica le dará consejos e instrucciones específicos según sus necesidades y su afección. También le enseñará cómo preparar e inyectar el Cortrophin Gel de la manera correcta, lo que incluye:

- ☑ **Dónde y cómo inyectarlo**
- ☑ **Cuánto administrar**
- ☑ **Con qué frecuencia administrarlo**

Pregunte a su proveedor de atención médica cuál método de inyección debe usar y cuáles son las mejores áreas para aplicar las inyecciones.

Áreas que deben evitarse al inyectar

NO administre Cortrophin Gel en:

- ☒ Una vena
- ☒ La boca
- ☒ El ombligo
- ☒ Áreas enrojecidas o inflamadas, o que están irritadas
- ☒ Áreas endurecidas o sensibles
- ☒ Áreas con inflamación, cicatrices, cortes o heridas
- ☒ Exactamente el mismo lugar varias veces por semana. Asegúrese de alternar los lugares de inyección en cada área del cuerpo cada vez que se inyecte y deje al menos 1 pulgada de separación entre los lugares de inyección

Llame a su proveedor de atención médica si tiene algún problema o cuestión que le impida continuar su tratamiento.

Para obtener información más detallada sobre los lugares para la inyección, consulte las páginas 9 y 11.

Qué suministros necesita reunir

Antes de comenzar, recolecte todos los insumos que necesitará para preparar e inyectarse Cortrophin Gel.

Necesitará lo siguiente:

Vial de Cortrophin Gel. El tamaño del vial no está a escala.

Jeringa

Aguja para extracción (de 20G o según lo indique su proveedor de atención médica)

Aguja para inyección (de 23G o según lo indique su proveedor de atención médica)

Dos toallitas de alcohol

Bolitas de algodón o una gasa



Vendaje (si es necesario)

Recipiente adecuado para desechar la aguja

Información de seguridad importante (continuación)

Informe a su médico si:

- Tiene o ha tenido algún otro problema de salud.
- Está tomando medicamentos recetados o de venta libre, como aspirina, vitaminas y suplementos alimenticios o a base de hierbas.
- Tiene alergias.
- Está por recibir alguna vacuna.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Cortrophin Gel puede dañar al bebé en gestación.
- Está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si Cortrophin Gel pasa a la leche materna y si puede dañar al bebé.

Preparación para la inyección

Cómo prepararse para la inyección

Antes de comenzar la inyección de Cortrophin Gel, lávese bien las manos y séqueselas con una toalla limpia.

Vuelva a verificar la fecha de vencimiento en el vial de Cortrophin Gel.

Recuerde que el medicamento del vial es un gel sólido que debe calentarse para convertirse en un gel líquido después de retirarlo del refrigerador y antes de aplicar la inyección. Puede hacerlo haciendo rodar el vial entre las manos durante unos minutos. Sabrá que está listo cuando el medicamento sea un gel líquido y no un gel sólido. **NO** caliente el vial en el microondas ni en la estufa.

Una vez que el vial esté listo, retire la tapa de plástico y deséchela. **NO** vuelva a colocar la tapa de plástico en el vial.

Luego, limpie el tapón de goma en la parte superior del vial con una nueva toallita de alcohol estéril. Deje que el alcohol se seque al aire. **NO** lo seque.

Tome una nueva aguja estéril de 20G (o el tamaño de aguja que le indicó su médico para la extracción) y conéctela a la jeringa.

NO use el vial si:

- ☒ Se observan signos de contaminación, como si el gel tiene un aspecto turbio o contiene partículas
- ☒

Vial	Han pasado más de:
5 mL	**28 días** después de la apertura del vial (se perforó el sello superior) o si ya pasó la fecha de vencimiento estampada en el vial.
1 mL	**6 meses** después de la apertura del vial (se perforó el sello superior) o si ya pasó la fecha de vencimiento estampada en el vial.



Ahora debería estar todo listo para cargar el Cortrophin Gel en la jeringa. Asegúrese de revisar las imágenes, ya que muchos de estos componentes y términos se utilizarán en la siguiente parte de las instrucciones.

Antes del siguiente paso, también puede usar esta tabla para recordar cuánto medicamento necesitará según lo que su proveedor de atención médica le haya recetado.

Cuadro de conversión de dosis de Cortrophin Gel

Unidades	Cantidad de inyección (mL)
120 unidades	1.5 mL
80 unidades	1 mL
40 unidades	0.5 mL
25 unidades	0.3125 mL

Si tiene alguna pregunta acerca de su dosis de Cortrophin Gel, consulte a su proveedor de atención médica para que lo asesore.

Estas no son todas las dosis posibles de Cortrophin Gel. Si necesita calcular dosis adicionales, cada incremento de 20 unidades da como resultado un aumento o una disminución de la cantidad de inyección de 0.25 mL. Por ejemplo, 100 unidades = 1.25 mL.

Información de seguridad importante (continuación)

¿Qué información importante debo saber sobre Cortrophin Gel?

Asegúrese de inyectarse Cortrophin Gel exactamente como se lo haya indicado su médico. Siempre inyecte Cortrophin Gel debajo de la piel o en un músculo. **No inyecte Cortrophin Gel directamente en una vena.**

- Es posible que tenga más probabilidades de contraer infecciones. Comuníquese con su médico ante el primer signo de infección o fiebre.
- Es posible que su cuerpo no produzca suficiente cortisol natural después de dejar de inyectarse Cortrophin Gel a largo plazo. Esto se llama insuficiencia suprarrenal. Es posible que su médico intente reducir su dosis gradualmente o que le recete un medicamento esteroide para protegerlo hasta que la glándula suprarrenal se recupere.
- Es posible que tenga presión arterial alta, que retenga demasiada sal y agua, o que tenga niveles bajos de potasio en la sangre. Como resultado, su médico puede recomendarle algunos cambios en su dieta, como consumir menos sal o tomar ciertos suplementos.
- El tratamiento con corticotropina puede ocultar síntomas de otras enfermedades. Si está ocurriendo algo más, puede ser más difícil para su médico hacer un diagnóstico.

Carga de la jeringa

Retire la tapa de la aguja e inserte la aguja directamente a través del tapón de goma en la parte superior del vial.

Con la aguja dentro del vial, tome el vial e inviértalo.

Asegúrese de que la aguja esté dentro del medicamento y tire del émbolo para extraer la cantidad de Cortrophin Gel que su proveedor de atención médica le haya indicado que use.

Si hay burbujas de aire en la jeringa, golpetee suavemente el costado de la jeringa para que se eleven hacia el extremo de la aguja. Luego, presione lentamente el émbolo hasta eliminar todas las burbujas de la jeringa.

Confirme que todavía tiene la cantidad correcta de medicamento para la inyección en la jeringa antes de retirar la aguja del vial. Una vez que lo haya confirmado, vuelva a guardar el vial de Cortrophin Gel en el refrigerador.



Verifique que no haya medicamento en la aguja, reemplace la aguja de 20G (o la que se le haya recetado para la extracción) por la aguja de 23G (o la que se le haya recetado para la inyección). Tenga cuidado al reemplazar la aguja. Si retiró el medicamento con la aguja que usará para la inyección, puede continuar con la siguiente sección.

☒ **NO** use la aguja de 20G para inyectarse

Ahora está listo para inyectarse.

Inyección debajo de la piel

Estas instrucciones son solo para aplicar las inyecciones debajo de la piel (subcutáneas)

Ubicación del lugar para la inyección

Antes de administrar el tratamiento, ya sea a usted mismo o a otra persona, es importante que decida dónde aplicará la inyección. Pregunte a su proveedor de atención médica qué áreas son mejores para aplicar la inyección en su caso.

Áreas adecuadas para la inyección subcutánea (debajo de la piel)



Parte superior del muslo:

El área para la inyección se encuentra en el centro del muslo, hacia la parte externa de la pierna.



Abdomen:

El área para la inyección se encuentra debajo de las costillas inferiores, en cualquier parte que tenga suficiente tejido para pellizcar. **NO** se inyecte en el ombligo.



Costado del brazo:

El área para la inyección se encuentra en la parte externa del brazo, entre la parte inferior del hueso del hombro y el codo, en cualquier parte que tenga suficiente tejido para pellizcar.



Parte posterior del brazo:

El área para la inyección se encuentra en la parte posterior del brazo, entre la parte inferior del hueso del hombro y el codo, en cualquier parte que tenga suficiente tejido para pellizcar.

Puede inyectarse en la misma área varias veces por semana, pero asegúrese de alternar los lugares de inyección en esa área cada vez, dejando al menos 1 pulgada de separación entre los lugares.



Aplicación de la inyección

Es importante que administre la inyección de la manera en que se lo indicó su proveedor de atención médica.

1

Desinfecte el área para la inyección

Prepare la piel donde va a aplicar la inyección frotándola con una nueva toallita de alcohol estéril. Deje secar al aire.

2



Sostenga la jeringa con la aguja hacia arriba y empuje lentamente el émbolo hasta que se formen pequeñas gotas en la punta de la aguja

Prepare la aguja para la inyección empujando lentamente el émbolo hasta que se forme una pequeña gota de medicamento en la punta de la aguja de 23G (o el tamaño de la aguja que le hayan indicado para la inyección).

3

Pellizque la piel alrededor del lugar de la inyección

NO toque el lugar donde planea inyectar Cortrophin Gel.

4



Inserte la aguja a un ángulo de 45° a través de la piel con un movimiento rápido

Suelte la piel y luego empuje el émbolo hasta que se vacíe todo el medicamento de la jeringa.

5



Retire la aguja

Retire la aguja con cuidado de no doblarla ni girarla. Una vez que retire la aguja, es posible que haya un poco de sangrado en el lugar de la inyección. Puede presionar una bolita de algodón o una gasa sobre el lugar de la inyección (no frote). Puede cubrir el lugar de la inyección con un vendaje, si es necesario.

Para llevar un registro de las inyecciones, descargue el calendario de inyecciones de Cortrophin Gel en Cortrophin.com.

Consulte la información de seguridad importante a lo largo de este folleto y la información de prescripción completa y las instrucciones de uso.

Inyección en un músculo

Estas instrucciones son solo para aplicar las inyecciones en un músculo (intramusculares)

Ubicación del lugar para la inyección

Antes de administrar el tratamiento, ya sea a usted mismo o a otra persona, es importante que decida dónde aplicará la inyección. En algunas personas, determinados músculos pueden no ser adecuados para las inyecciones, por lo que debe consultar a su proveedor de atención médica qué áreas de inyección son las más adecuadas para usted.

Áreas adecuadas para la inyección intramuscular (en un músculo)



Músculo de la parte superior externa del muslo:

El área para la inyección se encuentra en el tercio medio del músculo que se extiende a lo largo del borde superior externo del hueso del muslo.

Para encontrar el tercio medio, coloque las yemas de los dedos de una mano en la rodilla con la palma apoyada en el muslo. Coloque las yemas de los dedos de la mano libre detrás de la palma de la primera mano. El área externa debajo de la segunda mano es el área donde debe inyectar.

Puede inyectarse en la misma área varias veces por semana, pero asegúrese de alternar los lugares de inyección en esa área cada vez, dejando al menos 1 pulgada de separación entre los lugares.



Músculo del brazo:

El área para la inyección es de 3 dedos de ancho por debajo del hueso del hombro en la parte externa del brazo.



Aplicación de la inyección

Es importante que administre la inyección de la manera en que se lo indicó su proveedor de atención médica.

1

Desinfecte el área para la inyección

Prepare la piel donde va a aplicar la inyección frotándola con una nueva toallita de alcohol estéril. Deje secar al aire.

2



Sostenga la jeringa con la aguja hacia arriba y empuje lentamente el émbolo hasta que se formen pequeñas gotas en la punta de la aguja

Prepare la aguja para la inyección empujando lentamente el émbolo hasta que se forme una pequeña gota de medicamento en la punta de la aguja de 23G (o el tamaño de la aguja que le hayan indicado para la inyección).

3



Estire y sostenga la piel alrededor del lugar de la inyección

4



Inserte la aguja a un ángulo de 90° a través de la piel con un movimiento rápido

Deje de estirar la piel y, luego, empuje el émbolo hasta vaciar todo el medicamento de la jeringa.

5



Retire la aguja

Retire la aguja con cuidado de no doblarla ni girarla. Una vez que retire la aguja, es posible que haya un poco de sangrado en el lugar de la inyección. Puede presionar una bolita de algodón o una gasa sobre el lugar de la inyección (no frote). Puede cubrir el lugar de la inyección con un vendaje, si es necesario.

Para llevar un registro de las inyecciones, descargue el calendario de inyecciones de Cortrophin Gel en Cortrophin.com.

Consulte la información de seguridad importante a lo largo de este folleto y la información de prescripción completa y las instrucciones de uso.

Cómo tirar (desechar) los suministros usados después de la inyección

Asegúrese de seguir las leyes estatales y locales con respecto a la eliminación adecuada de los suministros médicos usados. Su proveedor de atención médica puede brindarle más información sobre este proceso.

Coloque las agujas y jeringas usadas en un recipiente para desecho de objetos punzantes aprobado por la FDA inmediatamente después de usarlas.

NO HAGA LO SIGUIENTE:

- ☒ Tirar (desechar) las agujas y jeringas usadas en la basura doméstica
- ☒ Reutilizar o reciclar suministros usados
- ☒ Guardar los suministros usados en un recipiente de plástico o vidrio transparente

Si no tiene un recipiente para objetos punzantes, use un recipiente de plástico grueso, como una botellón de detergente, que:

- ☑ Tenga una tapa que cierre firmemente
- ☑ Sea a prueba de pinchazos y filtraciones
- ☑ Esté correctamente etiquetado para advertir sobre los desechos peligrosos que se encuentran en el interior

Cuándo tirar los viales de Cortrophin Gel

Vial	Cuándo tirarlo (desecharlo)
5 mL	**28 días** después de la apertura del vial (se perforó el sello superior) o en la fecha de vencimiento estampada en el vial, lo que ocurra primero.
1 mL	**6 meses** después de la apertura del vial (se perforó el sello superior) o en la fecha de vencimiento estampada en el vial, lo que ocurra primero.

Recordatorio:

Escriba la fecha modificada en la que se debe desechar en el espacio provisto en la caja.

Una vez que el recipiente esté lleno, siga las instrucciones de eliminación correspondientes a su estado. Para ello:

- **Hable con su médico, enfermero o farmacéutico**
- **Visite el sitio web de la FDA en FDA.gov/SafeSharpsDisposal**

Consulte la información de seguridad importante a lo largo de este folleto y la información de prescripción completa y las instrucciones de uso.

Programa de apoyo

Cortrophin In Your Corner™

Apoyo diseñado para ayudarle durante todo el proceso del tratamiento

Cortrophin In Your Corner es un programa exclusivo diseñado para brindarle apoyo y ayudarle a acceder al tratamiento. Una vez que se le receta Cortrophin Gel, el programa *Cortrophin In Your Corner** puede brindarle apoyo e información educativa durante su tratamiento.

Nuestro equipo de expertos está a su disposición para ayudarle a:

- Obtener información sobre la cobertura de su seguro y apoyo financiero, incluso asistencia con los copagos
- Coordinar envíos con la farmacia especializada que provee su medicamento (si corresponde)
- Obtener acceso a recursos útiles y respuestas a las preguntas que pueda tener
- Un enfermero especialista en acceso† exclusivo puede ayudarle a transitar el proceso del tratamiento y coordinar que reciba capacitación adicional para aplicar las inyecciones
- Hay un centro de apoyo para responder sus preguntas y brindar información educativa

***No todos los pacientes serán elegibles para todos los servicios que ofrece *Cortrophin In Your Corner*.**
†Los enfermeros especialistas en acceso no brindan asesoramiento médico y le indicarán que hable con su proveedor de atención médica si tiene preguntas relacionadas con el tratamiento.

¿Tiene preguntas? Llámenos al 1-888-CIYC-NOW (1-888-249-2669)

O, para obtener más información sobre *Cortrophin In Your Corner*, visite Cortrophin.com/Support

Información de seguridad importante (continuación)

¿Qué información importante debo saber sobre Cortrophin Gel? (continuación)

- El tratamiento con Cortrophin Gel puede hacer que se sienta irritable o deprimido. También puede producirle cambios anímicos o problemas para dormir.
- Es posible que desarrolle ciertas afecciones oculares, como cataratas, glaucoma o daño en el nervio óptico.
- Es posible que desarrolle alergias a Cortrophin Gel. Estas alergias pueden ser graves. Los signos de una reacción alérgica incluyen mareos, náuseas y vómitos, reacciones en la piel (erupción o picazón), hinchazón del rostro, la lengua, los labios o la garganta y dificultad para respirar.
- Los efectos de Cortrophin Gel pueden intensificarse si tiene tiroides hipoactiva o cirrosis hepática.

Los efectos secundarios de Cortrophin Gel incluyen retención de líquido o sal; aumento de peso; debilidad muscular; osteoporosis, úlceras estomacales con posible sangrado; reacciones en el lugar de la inyección; deficiencia de la cicatrización de heridas; presión arterial alta; convulsiones; dolor de cabeza; presentación de un estado cushingoide (una afección hormonal a menudo caracterizada por hinchazón facial y aumento de peso); supresión del crecimiento en niños; y reacciones alérgicas que pueden ser graves.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de Cortrophin Gel. Llame a su médico o farmacéutico para pedirle asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088 o www.fda.gov/medwatch.

Uso e información de seguridad

Indicaciones

¿Qué es Purified Cortrophin Gel?

Purified Cortrophin Gel es un medicamento de venta con receta que se inyecta debajo de la piel o en un músculo. Se utiliza con los siguientes fines:

- Tratamiento complementario a corto plazo para ayudar a controlar episodios agudos o ataques de artritis reumatoide, incluida la artritis reumatoide juvenil; artritis psoriásica; espondilitis anquilosante y artritis gotosa aguda.
- Tratamiento de exacerbaciones o tratamiento de mantenimiento en determinados casos de lupus eritematoso sistémico y dermatomiositis sistémica (polimiositis).
- Tratamiento de reacciones cutáneas graves (síndrome de Stevens-Johnson) y psoriasis grave.
- Tratamiento de la dermatitis atópica (eccema) y la enfermedad del suero.
- Tratamiento de afecciones alérgicas e inflamatorias crónicas y agudas graves en diferentes partes del ojo. Esto puede incluir la parte frontal del ojo, como la córnea y el iris, o la parte posterior del ojo, como el nervio óptico y la retina.
- Tratamiento para personas con síntomas de sarcoidosis.
- Reducción de proteínas en la orina de personas con síndrome nefrótico del tipo idiopático (de origen desconocido) sin uremia (acumulación de urea en la sangre debida a disfunción renal) o debido a lupus.
- Ataques agudos o exacerbaciones de la esclerosis múltiple.

Información de seguridad importante

NO use Cortrophin Gel si tiene alguna de las siguientes afecciones:

- Una afección de la piel llamada esclerodermia
- Pérdida de densidad ósea u osteoporosis
- Infecciones micóticas
- Herpes simple ocular (infección ocular)
- Una cirugía reciente
- Úlceras estomacales o antecedentes de úlceras estomacales
- Insuficiencia cardíaca
- Presión arterial alta
- Alergias a proteínas derivadas del cerdo
- Glándulas suprarrenales que no producen suficiente cantidad de la hormona cortisol (insuficiencia corticosuprarrenal primaria) o
- Corteza suprarrenal que produce demasiada cantidad de las hormonas cortisol y aldosterona (hiperfunción corticosuprarrenal)

Informe a su médico si:

- Tiene o ha tenido algún otro problema de salud.
- Está tomando medicamentos recetados o de venta libre, como aspirina, vitaminas y suplementos alimenticios o a base de hierbas.
- Tiene alergias.
- Está por recibir alguna vacuna.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Cortrophin Gel puede dañar al bebé en gestación.
- Está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si Cortrophin Gel pasa a la leche materna y si puede dañar al bebé.

Información de seguridad importante (continuación)

¿Qué información importante debo saber sobre Cortrophin Gel?

Asegúrese de inyectarse Cortrophin Gel exactamente como se lo haya indicado su médico. Siempre inyecte Cortrophin Gel debajo de la piel o en un músculo. **No inyecte Cortrophin Gel directamente en una vena.**

- Es posible que tenga más probabilidades de contraer infecciones. Comuníquese con su médico ante el primer signo de infección o fiebre.
- Es posible que su cuerpo no produzca suficiente cortisol natural después de dejar de inyectarse Cortrophin Gel a largo plazo. Esto se llama insuficiencia suprarrenal. Es posible que su médico intente reducir su dosis gradualmente o que le recete un medicamento esteroide para protegerlo hasta que la glándula suprarrenal se recupere.
- Es posible que tenga presión arterial alta, que retenga demasiada sal y agua, o que tenga niveles bajos de potasio en la sangre. Como resultado, su médico puede recomendarle algunos cambios en su dieta, como consumir menos sal o tomar ciertos suplementos.
- El tratamiento con corticotropina puede ocultar síntomas de otras enfermedades. Si está ocurriendo algo más, puede ser más difícil para su médico hacer un diagnóstico.
- El tratamiento con Cortrophin Gel puede hacer que se sienta irritable o deprimido. También puede producirle cambios anímicos o problemas para dormir.
- Es posible que desarrolle ciertas afecciones oculares, como cataratas, glaucoma o daño en el nervio óptico.
- Es posible que desarrolle alergias a Cortrophin Gel. Estas alergias pueden ser graves. Los signos de una reacción alérgica incluyen mareos, náuseas y vómitos, reacciones en la piel (erupción o picazón), hinchazón del rostro, la lengua, los labios o la garganta y dificultad para respirar.
- Los efectos de Cortrophin Gel pueden intensificarse si tiene tiroides hipoactiva o cirrosis hepática.

Los efectos secundarios de Cortrophin Gel incluyen retención de líquido o sal; aumento de peso; debilidad muscular; osteoporosis, úlceras estomacales con posible sangrado; reacciones en el lugar de la inyección; deficiencia de la cicatrización de heridas; presión arterial alta; convulsiones; dolor de cabeza; presentación de un estado cushingoide (una afección hormonal a menudo caracterizada por hinchazón facial y aumento de peso); supresión del crecimiento en niños; y reacciones alérgicas que pueden ser graves.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de Cortrophin Gel. Llame a su médico o farmacéutico para pedirle asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088 o www.fda.gov/medwatch.

Consulte la información de prescripción completa y las instrucciones de uso.

Escanee este código para ver un video sobre el uso de Cortrophin Gel.

ani Pharmaceuticals, Inc.
© Copyright 2025 ANI Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados.
US-CG-2200191 10/2025

Purified Cortrophin® Gel
repository corticotropin injection USP 80 U/mL